

# Očkovania, ktoré sa majú ponúknuť, ak nie je k dispozícii dokumentovaný dôkaz o predchádzajúcom očkovaní



Choroba	Deti a dospelí (< 18 rokov)	Dospelí (> 18 rokov)
<b>Prioritné očkovania</b>		
<b>COVID-19</b>	Spôsobilým deťom a dospelým ponúknite základnú očkovaciu schému mRNA vakcínou podľa usmernení hostiteľskej krajiny (v EÚ/EHP sú schválené očkovacie látky Comirnaty pre deti vo veku ≥ 5 rokov a Spikevax pre deti vo veku ≥ 6 rokov). Dospelým vo veku ≥ 12 rokov ponúknite posilňovaciu dávku podľa usmernení hostiteľskej krajiny (v EÚ/EHP je schválená len očkovacia látka Comirnaty).	Všetkým dospelým ponúknite základné očkovanie a posilňovaciu dávku (dávky) podľa usmernení hostiteľskej krajiny. Môže sa zvažiť použitie jednodávkového očkovacieho látky v rámci základného očkovania (napr. očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 Janssen), najmä ak by podanie druhej dávky na dokončenie základnej série mohlo byť problematické.
<b>Osýpky Mumps Ružienka</b>	Jedincom vo veku ≥ 9 mesiacov ponúknite očkovanie MMR. Je potrebné podať dve dávky MMR* v odstupe najmenej jeden mesiac, ale prednostne aj viac v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny. Očkovacia látka proti osýpkam podaná pred dosiahnutím veku 12 mesiacov nevyvoláva ochranu u všetkých a je potrebné zopakovať ju po dosiahnutí veku 12 mesiacov.	Ponúknite buď jednu dávku alebo v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny.*
<b>Záškrt Tetanus Čierny kašeľ Detská obrna Hib</b>	Jedincom vo veku ≥ 2 mesiace ponúknite tri dávky očkovacej látky obsahujúcej DTaP-IPV-Hib (zložka Hib len pre deti vo veku < 6 rokov, ak nie sú k dispozícii iné odporúčania špecifické pre danú krajinu) v odstupe najmenej jeden mesiac a následne posilňovaciu dávku v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny. Pentavalentné a hexavalentné kombinované očkovacie látky sú schválené do veku šesť rokov.	Všetkým dospelým ponúknite základnú sériu očkovacích látok proti záškrtu, tetanu a detskej obrne alebo v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny.
<b>Do úvahy prichádza</b>		
<b>Hepatitída B</b>	Jedincom vo veku ≥ 2 mesiace ponúknite tri dávky v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny. ** Ponúknite novorodencom HBsAg-pozitívnych matiek do 24 hodín po narodení v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny.	Ponúknite všetkým dospelým s predchádzajúcim skríningom alebo bez neho v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny.
<b>Meningokokové ochorenie</b>	Aplikujte usmernenia hostiteľskej krajiny pre očkovacie látky proti meningokokom, séro skupiny A, B, C, W135 a Y, pričom treba zohľadniť epidemiologickú situáciu.	
<b>Pneumokokové ochorenie</b>	Jedincom vo veku ≥ 2 mesiace ponúknite 1 – 3 dávky konjugovanej očkovacej látky v odstupe najmenej jeden mesiac v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny.	Ponúknite jedincom vo veku ≥ 65 rokov v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny.
<b>Ovčie kiahne*</b>	Je potrebné dodržať usmernenia hostiteľskej krajiny, ak z epidemiologickej situácie nevyplýva inak. V prípade použitia ponúknite dve dávky očkovacej látky proti ovčím kiahňam jedincom vo veku ≥ 11 mesiacov v odstupe najmenej jeden mesiac, ale prednostne aj viac.	Je potrebné dodržať usmernenia hostiteľskej krajiny, pričom treba zohľadniť epidemiologickú situáciu. Zvážte očkovanie neimúnnych žien v plodnom veku, ktoré nie sú tehotné.
<b>Chríпка</b>	Je potrebné dodržať usmernenia hostiteľskej krajiny, ak z epidemiologickej situácie nevyplýva iné. Zvážte očkovanie rizikových skupín starších ako šesť mesiacov pred chrípkovou sezónou a počas nej.	Je potrebné dodržať usmernenia hostiteľskej krajiny, pričom treba zohľadniť epidemiologickú situáciu. Zvážte očkovanie rizikových skupín vrátane tehotných žien pred chrípkovou sezónou a počas nej.
<b>Tuberkulóza</b>	Ponúknite BCG v súlade s usmerneniami hostiteľskej krajiny. Opakované očkovanie s použitím BCG sa neodporúča.	BCG sa vo všeobecnosti neodporúča u dospelých, v závislosti od epidemiologickej situácie.

\* Očkovacia látka MMR a očkovacia látka proti ovčím kiahňam sú kontraindikované u imunokompromitovaných jedincov a počas tehotenstva. Jeden mesiac po očkovaní s použitím MMR je potrebné vyhnúť sa tehotenstvu.

\*\* Pred podaním očkovacej látky by sa mohli vykonať testy na infekciu spôsobenú vírusom hepatitídy B (HBsAg) v závislosti od usmernení hostiteľskej krajiny.